

cs Návod k použití Pěnový krém Allpresan® diabetic INTENSIVE

Stanovení účelu: Pěnový krém Allpresan® diabetic INTENSIVE je zdravotnický prostředek na speciální ošetřování suché až popraskané pokožky na nohách při cukrovce. Vhodný i na ošetřování okrajů ran. Prostřednictvím průdušné, dvojdimenzionální ochranné sítě posiluje funkci pokožky jako bariéry a předchází vzniku kožních infekcí a ulceraci (tvorbě vředů). **Aplikace:** Ráno a večer naneste krém v množství velikosti lískového až vlašského ořechu na postižené místo na noze. Ideální i na aplikaci na místech mezi prsty. Rychle se vstřebává, aniž by zanechal nepříjemný mastný film. Ihned po aplikaci si můžete obléci punčochy, kompresivní punčochy. Neaplikujte u oblasti očí a sliznic nebo do ran. Nepoužívejte po uplynutí data trvanlivosti. Jen na vější použití. **Vedlejší účinky:** Používání přípravku Allpresan® diabetic může způsobit krátkodobé podráždění pokožky (např. pálení, svrbení, začervenání) především tehdy, pokud pěnový krém s močovinou nanesete na silně podrážděnou pokožku. **Kontraindikace:** Nepoužívejte v případě známé přecitlivělosti na jednu z obsažených látek. Nepoužívejte u kojenců a dětí do 5 let. **Interakce:** Uvnitřní jiných účinných látek z jiných výrobků aplikovaných zevně, jejichž vniknutí do pokožky může urea zintenzivnit. Pokud svoji pokožku již ošetřujete výrobky aplikovanými zevně, konzultujte možnost použití krému s lékařem nebo lékárníkem. **Co je třeba respektovat?**: Varování. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. Chraňte před teplem/jiskrami/otevřeným plamenem/horkými povrchy. - Zákaz koufání. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. 9 % hmotn. náplně je hořlavých. Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122 °F. Uchovávejte mimo dosah dětí. Uchovávajte mimo dosah dětí. Používejte pouze venku nebo v dobré větraných prostorách.

Před každým použitím dobře protřepat a za účelem aplikace držet rovně (ne nad hlavou!).



Obsažené látky: Aqua, Urea, Butane, Decyl Oleate, Octyldodecanol, Cetearyl Alcohol, Propane, Stearic Acid, Propylene Glycol, Glycerin, Glyceryl Stearate, Panthenol, Saccharide Isomerate, Undecyl Alcohol, Allantoin, Potassium Lauroyl Wheat Amino Acids, Palm Glycerides, Capryloyl Glycine, Sodium Lauroyl Sarcosinate, Citric Acid. Pentavitin® made by Pentapharm Ltd.

Výrobce:

NSC Pharma GmbH & Co. KG
Mergenthalerstr. 40 · 48268 Greven · GERMANY
www.allpresan.com

Stav informaci: 04/2016

Vysvětlení grafických značek:

- Respektujte návod k použití
- Označení šarže
- Číslo výrobku
- Použitelné do
- Pozor, respektujte pokyny
- Maximální teplota skladování



sk Návod na použitie Allpresan® diabetic krémová pena INTENSIVE

Stanovenie účelu: Krémová pena Allpresan® diabetic INTENSIVE je zdravotnícka pomôcka na ošetroenie suchej až popraskanej pokožky na nohách pri cukrovke. Je vhodná aj na ošetroenie okrajov rán. Prostredníctvom priedušnej, dvojdimenzionálnej ochranné sítie posiluje funkciu pokožky ako bariéry a predchádza vzniku kožných infekcií a ulcerácií (tvorbe vředů). **Použitie:** Ráno a večer naneste krémovú penu v množstve vo veľkosti lieskového až vlašského orecha na postižené miesto na nohe. Je vhodná aj na aplikáciu na miesta medzi prstami. Rýchlo sa vstrebé bez toho, aby zanechala neprijemný mastný film. Ihned po aplikácii si môžete obliecť pančuchy alebo kompresívne pančuchy. Neaplikujte u oblasti očí a sliznic alebo na rany. Nepoužívajte po uplynutí času použiteľnosti. Len na vonkajšie použitie. **Vedľajšie účinky:** Používanie prípravku Allpresan® diabetic môže spôsobiť krátkodobé podráždenie pokožky (napr. pálenie, svrbenie, začervenanie), zvášiť vtedy, keď sa pěnový krém s močovinou nanesie na silné podráždené miesta na pokožke. **Kontraindikácie:** Nepoužívajte v prípade známé precitlivosti na akúkoľvek zložku výrobku. Nepoužívajte u dojčiat detí mälských ako 5 rokov. **Interakcie:** Urea môže zosilniť uvoľňovanie iných účinných látok z ostatných produktov určených na vonkajšie použitie a ich prenikanie do pokožky. Ak už používate produkty na vonkajšie použitie, ďalej používanie konzultujte s lekárom alebo lekárnikom. **Čo treba respektovať?**: Pozor. Nádoba je pod tlakom: Pri zahriatí sa môže roztrhnúť. Uchovávajte mimo dosahu tepla/iskier/otvoreného ohňa/horúcich povrchov. Neďaleko. Nestříkejte na otvorený ohň ani iný zdroj zapálenia. 9 % hmotnosti obsahu je horlavých. Neprepichujte alebo nespalujte ju, a to ani po spotrebovaní obsahu. Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám nad 50 °C/122 °F. Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore.

Pred každým použitím nádoby dobre potraste a držte ju zvislo (nie nadol).



Zloženie: Aqua, Urea, Butane, Decyl Oleate, Octyldodecanol, Cetearyl Alcohol, Propane, Stearic Acid, Propylene Glycol, Glycerin, Glyceryl Stearate, Panthenol, Saccharide Isomerate, Undecyl Alcohol, Allantoin, Potassium Lauroyl Wheat Amino Acids, Palm Glycerides, Capryloyl Glycine, Sodium Lauroyl Sarcosinate, Citric Acid. Pentavitin® made by Pentapharm Ltd.

Výrobca:

NSC Pharma GmbH & Co. KG
Mergenthalerstr. 40 · 48268 Greven · GERMANY
www.allpresan.com

Naposledy upravené: 04/2016

Vysvetlivky :

- Prečítajte si návod na použitie
- Číslo šarže
- Kód produktu
- Použitelné do
- Upozornenie, dávajte pozor
- Maximálna teplota skladovania



pl

Instrukcja użycia Krem w piance Allpresan® diabetic INTENSIVE

Określenie przeznaczenia: Krem w piance Allpresan® diabetic INTENSIVE jest produktem medycznym do specjalnej pielęgnacji bardzo suchej i popękanej skóry stóp w przypadku występowania cukrzycy typu 1 (Diabetes mellitus) - dawniej określanej cukrzycą insulinozależną. Przeznaczony jest także do pielęgnacji krawędzi ran. Wzmacnia działanie bariery skóry dzięki aktywnej oddechowej, dwuwymiarowej sieci ochronnej i zapobiega w ten sposób infekcji skóry i owrzodzeniu. **Zastosowanie:** Rano i wieczorem nanieść niewielką ilość kremu o wielkości orzucha laskowego lub włoskiego na dotknięte rejony stopy. Idealny również do pielęgnacji przestrzeni między palcami. Szybko się wchłania, nie pozostawia tłustej warstwy. Pończochy i pończochy kompresywne można ubierać natychmiast po zastosowaniu kremu. △ Nie smarować miejsc wokół oczu i błon śluzowych lub samych ran. Nie używać po upływie daty ważności. Tylko do użytku zewnętrznego. △ **Skutki uboczne:** Zastosowanie Allpresan® diabetic może wywołać krótkotrwale podrażnienia skóry (np. palenie, święcenie, zaczernienie), w szczególności wtedy, gdy zawierający mocznik krem piankowy zostanie nałożony na mocno podrażnioną powierzchnię skóry. △ **Przeciwskazania:** Nie stosować w przypadku znanej nadwrażliwości na jeden ze składników. Nie stosować u noworodków i dzieci poniżej 5 roku życia. △ **Interakcje:** Uwalnianie innych substancji biologicznie aktywnych z innych zewnętrznie użytych produktów i ich wnikanie w skórę może być wzmacniane przez mocznik. W przypadku leczenia innymi produktami stosowanymi zewnętrznie prosimy zasięgnąć opinię lekarza lub farmaceuty. △ **Środki ostrożności?** Uwaga. Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem. Przechowywać z dala od źródeł ciepła/iskrzenia/otwartego ognia/gorących powierzchni. Palenie wzbronione. Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu. 9 % wagowych zawartości jest łatwopalne. Nie przeklukać ani nie spałać, nawet po zużyciu. Chroń przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50 °C/122 °F. Chroń przed dziećmi. Stosować wyłącznie w wentylowanych pomieszczeniach.

Przed każdym użyciem pojemnik dobrze
potrząsnąć i trzymać pionowo przy naciskaniu
(nie trzymać do góry nogami!).



Stan informacji: 04/2016

Objaśnienie symboli:



Proszę używać zgodnie z instrukcją



Oznaczenie serii



Nr artykułu



okres przydatności do użycia



Uwaga, przestrzegać wskazówek



25°C maksymalna temperatura przechowywania

CE 0482

Składniki: Aqua, Urea, Butane, Decyl Oleate, Octyldodecanol, Cetearyl Alcohol, Propane, Stearic Acid, Propylene Glycol, Glycerin, Glyceryl Stearate, Panthenol, Saccharide Isomerate, Undecyl Alcohol, Allantoin, Potassium Lauroyl Wheat Amino Acids, Palm Glycerides, Capryloyl Glycine, Sodium Lauroyl Sarcosinate, Sodium Citrate, Citric Acid. Pentavitin® made by Pentapharm Ltd.

Producent:

NSC Pharma GmbH & Co. KG

Mergenthalerstr. 40 · 48268 Greven · GERMANY

www.allpresan.com